


# RAMBO

## 48

## TRICLOPYR

### HERBICIDA SELECTIVO SISTÉMICO

Cultivos de arroz • áreas sin cultivar • malezas en potreros • costados de carreteras



#### EFFECTO SOBRE MALEZAS Y CULTIVOS

**RAMBO 48** es un herbicida selectivo sistémico que es rápidamente absorbido por el follaje y las raíces con traslocaciones a través de la planta, acumulándose en el tejido meristemático. Induce a varios tipos de auxinas hormonales, efectos tales como: deformación de las hojas, distorsión, resequeidad progresiva y muerte.

Es especialmente activo contra el matorral. Elimina arbustos de roble, pinos, sauce, aliso y a varias especies difíciles de controlar sin dañar el pasto.

#### VENTAJAS DE RAMBO

- Tiene efecto erradicante de malezas leñosas y semileñosas.
- Puede ser empleado para el control de la mayoría de malezas dicotiledoneas, aún las más difíciles de controlar.
- Es eficiente en la desvitalización de muñones.
- Tiene efecto protector cuando es aplicado en malezas de pastos y arrozales.

#### MODO DE APLICACIÓN

Terrestre y aéreo.

Debe ser aplicado mediante rociado foliar hasta que corra, y preferentemente durante el periodo de desarrollo de las plantas a eliminar.

Para el control de tocones de arbustos y malezas leñosas se puede mezclar con diesel usando 80 - 200 ml de diesel y 125 ml de **RAMBO 48**. Aplicar con una brocha o dirigido hacia el tocón o tronco de la maleza recién cortado.

**NOTA:** en potreros es recomendable usarlo en mezcla con 2.4-D Amina, utilizando una relación de 125 cc por litro de Amina.

#### PERIODOS DE CARENCIA

Para los cultivos en general no hay límite de intervalo entre la aplicación y la cosecha, en todo caso se respetaran las limitaciones e instrucciones de uso para cada cultivo. En pastos no meter el ganado hasta que haya muerto la maleza tratada (+/- veinte días)

#### FECHA DE REINGRESO AL AREA TRATADA

No hay límite para el reingreso, esperar hasta que seque el rocío de la aplicación.

#### EFFECTOS EN CULTIVOS SUCESIVOS

No tiene efecto alguno sobre nuevos cultivos.

#### CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

III LIGERAMENTE PELIGROSO

## MODO DE EMPLEO:

Preparar la mezcla en un tanque con agua, hasta la mitad, luego añadir la cantidad recomendada de **RAMBO 48**, agitar y agregar el resto de agua. En caso de mezcla con otros herbicidas proceder en igual forma, agitar la mezcla y luego aplicar. "No aplicar el producto cuando está por llover".

## INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (l/ha)	EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
ARROZ ( <i>Oryza sativa</i> )	Clavo de agua	<i>Ludwigia spp.</i>	0.25 l	Aplicar cuando el arroz tenga entre 15 y 20 días de germinado y las malezas tengan de 2 a 3 hojas. Se puede mezclar con propaniles.
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>	0.5 l	
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	en ciertos casos	
	Botoncillo	<i>Eclipta alba</i>	mezclarlos	
	Achochilla	<i>Momordica charantia</i>	con 2,4-D	
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	en relación	
	Cortadera	<i>Cyperus esculentus</i>	1.1	
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>		
	Mangona	<i>Commelina diffusa</i>		
	Batatilla	<i>Ipomoea spp.</i>		
	Mimosa	<i>Mimosa pudica</i>		
	Monocoria	<i>Monochoria vaginalis</i>		
POTREROS	Bledo	<i>Amaranthus hybridus</i>	0.3 l	En malezas semileñosas, aplicar la dosis más baja. Aplicar cuando las malezas están en activo desarrollo, asegurándose de lograr una buena cobertura. Se puede mezclar con 2,4-D. 125 cc por litro de 2,4-D Amina.
	Escoba	<i>Sida spp.</i>	0.5 l	
	Mata caballo	<i>Asclepias curassavica</i>	en 100 litros	
	Platanillo	<i>Heliconia bijao</i>	de agua	
	Papa china	<i>Caladium sp.</i>		
	Chilca	<i>Clasidium sp.</i>		
Espino	<i>Mimosa pigra</i>			
AREAS SIN CULTIVAR Bordes de camino	Escoba	<i>Sida spp.</i>	0.5 l	Lograr una buena cobertura. Se puede mezclar con Diesel usando 20 - 80 cc/l de Diesel. Aplicar al tronco.
	Espino	<i>Mimosa pigra</i>	en 100 litros	
	Betillas	<i>Ipomoea spp.</i>	de agua	

## REGISTRO UNIFICADO MAG N°: 096-H 1-SESA-U



**IMPORTANTE:** Después de usar el contenido, enjuagar 3 veces el envase y verter el agua del lavado en el tanque de aplicación. Destruir luego el envase.

Usar los insumos agrícolas, con el debido conocimiento, y teniendo en cuenta las instrucciones dadas en la etiqueta.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



FABRICADO POR:



PRINCIPAL GUAYAQUIL: Av. Juan Tanca Marengo km 3,5 PBX: (04) 2233-333 • Fax: (04) 2237-973 - 2232-166 • P.O. Box: 09-01-5125 • E-mail: afecor@gye.satnet.net  
 SUCURSAL MAYOR QUITO: Av. 6 de Diciembre y Santa Lucía Esquina Teléfono: (02) 2475-602 Fax: (02) 2478-179 • E-mail: afecor@qt.satnet.net  
 BABAHYOYO: Cda. El Mamey, calle Av. 1 NE ( Av. Universitaria) y Tiwinza, frente al colegio Padre Marcos Benetazzo • Telefax: (05) 2730-272  
 LOJA: Av. Cuxibamba entre Ibarra y Latacunga Telefax: (07) 2576-392  
 MACHALA: Av. Madero Vargas Vía Puerto Bolívar (diagonal a la Clínica Rojas) • Teléfono: (07) 2929-892 Fax: (07) 2929-040  
 MILAGRO: Km 1.5 Vía Milagro - Naranjito, junto a la Academia Naval Guayaquil. • Telefax: (04) 2974-026  
 PORTOVIEJO: Km 2 vía Crucita junto al Cuartel de la Policía • Telefax: (05) 2637-757